

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Einnahme dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

VITAGUTT®

VITAMIN E

1000

Kapseln

Wirkstoff: all-rac-alpha-Tocopherylacetat

Zusammensetzung

1 Kapsel enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1000 mg all-rac-alpha-Tocopherylacetat (entsprechend 670 mg RRR-alpha-Tocopherol-Äquivalenten).

Hinweis:

all-rac-alpha-Tocopherylacetat gehört zu den Stoffen, die zusammenfassend als „Vitamin E“ bezeichnet werden.

Sonstige Bestandteile:

Gelatine, Glycerol, Sojabohnenöl, Sorbitol-Lösung

Darreichungsform und Inhalt

- Kapseln - Packung mit 30 Kapseln
- Packung mit 60 Kapseln

Vitaminpräparat

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

KG SCHWARZHAUPT GMBH & CO.
Chemisch-pharmazeutische Fabrik
Sachsenring 37-47
50677 Köln
Telefon: 0221/3393-0
Telefax: 0221/3393527

Anwendungsgebiete

Behandlung eines Vitamin-E-Mangels

Vitagutt® Vitamin E 1000 ist nicht geeignet zur Behandlung von Vitamin-E-Mangelzuständen, die mit einer gestörten Aufnahme von Vitamin E aus dem Darm einhergehen. In diesen Fällen stehen parenterale Zubereitungen zur Verfügung.

Gegenanzeigen

Es liegen keine Gegenanzeigen vor.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die empfohlene tägliche Aufnahme von Vitamin E beträgt 15 mg. Vitamin E passiert die Plazenta und geht in die Muttermilch über. Bislang wurden beim ungeborenen Kind - auch bei höheren Einnahmemengen - keine Schädigungen beobachtet. Mögliche Störungen der Fruchtbarkeit nach Vitamin-E-Gaben, die oberhalb der täglichen empfohlenen Dosis liegen, sind nicht ausreichend untersucht worden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Vitagutt® Vitamin E 1000?

Die Wirkung von Vitagutt® Vitamin E 1000 kann bei gleichzeitiger Gabe von eisenhaltigen Arzneimitteln vermindert werden.

Welche anderen Arzneimittel werden in ihrer Wirkung durch Vitagutt® Vitamin E 1000 beeinflusst?

Bei einem gleichzeitig bestehenden Vitamin-E- und Vitamin-K-Mangel, der durch eine ungenügende Aufnahme im Darm bedingt ist, sowie bei Gabe von Arzneimitteln mit einer gegen Vitamin K gerichteten Wirkung (z.B. bei Arzneimitteln, die die Blutgerinnung hemmen) ist die Blutgerinnung sorgfältig zu überwachen, da es in Einzelfällen zu einem starken Abfall von Vitamin K kam.

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Vitagutt® Vitamin E 1000 nicht anders verordnet hat.

Wieviel von Vitagutt® Vitamin E 1000 und wie oft sollten Sie Vitagutt® Vitamin E 1000 einnehmen?

Erwachsene nehmen täglich 1 Kapsel Vitagutt® Vitamin E 1000 (entsprechend 1000 mg all-rac-alpha-Tocopherylacetat) ein. Für Kinder stehen Präparate mit einem niedrigeren Wirkstoffgehalt zur Verfügung.

Wie und wann sollten Sie Vitagutt® Vitamin E 1000 einnehmen?

Die Kapseln werden unzerkaut mit etwas Flüssigkeit eingenommen.

Wie lange sollten Sie Vitagutt® Vitamin E 1000 einnehmen?

Die Dauer der Einnahme ist abhängig vom Verlauf der Grunderkrankung. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt!

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Vitagutt® Vitamin E 1000 in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Gefährliche Krankheitserscheinungen bei Überdosierung sind nicht bekannt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zuwenig Vitagutt® Vitamin E 1000 eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Fahren Sie mit der Anwendung fort, so wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Vitagutt® Vitamin E 1000 auftreten?

In Einzelfällen treten bei hohen Dosen in einem Bereich von 1200 mg all-rac-alpha-Tocopherylacetat (entsprechend 804 mg RRR-alpha-Tocopherol-Äquivalenten) Magen- und Darmbeschwerden auf.

Bei längerer Einnahme von Dosen über 600 mg all-rac-alpha-Tocopherylacetat (entsprechend 402 mg RRR-alpha-Tocopherol-Äquivalenten) kann es zu einer Senkung des Schilddrüsenhormonspiegels im Blut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist außen auf der Faltschachtel und auf jedem Blisterstreifen aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses oder nach Herstellung der gebrauchsfertigen Zubereitung.

Die Haltbarkeit wird nicht beeinträchtigt und entspricht weiterhin dem Haltbarkeitsaufdruck.

Wie ist Vitagutt® Vitamin E 1000 aufzubewahren?

Vitagutt® Vitamin E 1000 ist bis zum Verbrauch trocken und nicht über 25° C aufzubewahren.

Wann ist Vitagutt® Vitamin E 1000 auch vor Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendbar?

Bei deutlich optischen Veränderungen der Kapseln sollte Vitagutt® Vitamin E 1000 nicht mehr verwendet werden.

Apothekenpflichtig

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information

August 1999



KG SCHWARZHAUPT GMBH & CO.
Sachsenring 37-47 · 50677 Köln