



Gelsemium N

Synergon Nr. 100

Homöopathisches Arzneimittel



Zusammensetzung:

10 g (11,0 ml) Mischung flüssiger Verdünnungen enthält:
arzneilich wirksame Bestandteile:

Pulsatilla pratensis Dil.	D 9	0,8 g
Acidum arsenicosum Dil.	D 30	1,0 g
Gelsemium sempervirens Dil.	D 4	1,0 g
Hydrargyrum bichloratum Dil.	D 30	1,0 g
Phytolacca americana Dil.	D 3	1,0 g
Toxicodendron quercifolium Dil.	D 12	1,0 g
Verbascum densiflorum Dil.	D 3	1,0 g
Cinchona pubescens Dil.	D 3	1,0 g
Gnaphalium polycephalum (HAB 34) Dil. (HAB, Vorschrift 3a)	D 2	0,1 g
Thuja occidentalis Dil.	D 2	0,1 g
Capsicum annuum Dil.	D 3	1,0 g
Spigelia anthelmia Dil.	D 3	1,0 g

1 g (1,1 ml) entspricht 35 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

20, 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Chininüberempfindlichkeit

Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.



Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweis: Enthält 62 Vol.-% Alkohol

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

Als einmalige Gabe 5 Tropfen einnehmen.

Die weitere Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Nebenwirkungen:

Nach Anwendung kann erneut Speichelfluß Auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information: Oktober 2003